

Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 26.-51. matemātikas olimpiādes"

## LATVIJAS REPUBLIKAS 37. OLIMPIĀDE


### ATRISINĀJUMI

**37.1.** Pieņemsim pretējo. Tad visiem diskriminantiem jābūt negatīviem, t.i.,  
 $a^2 < b$ ,  $b^2 < a$ ,  $1 < ab$ .

No pirmajām divām nevienādībām seko, ka  $a > 0$  un  $b > 0$ .

Sareizinot tās un saīsinot abas puses ar  $ab$ , iegūstam  $ab < 1$ , kas ir pretrunā ar trešo nevienādību.

**37.1.** Novelkam  $CE \parallel AB$  (skat. 37.2. zīm.).




37.2. zīm.

Tad  $ABCD$  ir rombs. Tā kā  $DE = DA - AE = DA - BC = CD$ , tad  $BDC$  ir vienādsānu trijstūris. Apzīmējam  $\angle CAE = \alpha$  un pakāpeniski iegūstam  
 $\angle BAC = \alpha$ ,  $\angle BCA = \alpha$ ,  $\angle ABC = 180^\circ - 2\alpha$ ,  $\angle ACE = \alpha$ ,  $\angle AEC = 180^\circ - 2\alpha$ ,  
 $\angle CED = 2\alpha$ ,  $\angle ECD = 2\alpha$ ,  $\angle EDC = 180^\circ - 4\alpha$ .


Tā kā  $ACD$  ir vienādsānu trijstūris, tad  $\angle CDE = \angle CAD = \alpha$ . Tātad  $180^\circ - 4\alpha = \alpha$  un  $\alpha = 36^\circ$ . Tāpēc trapeces leņķi ir  $72^\circ, 108^\circ, 144^\circ, 36^\circ$ .

**37.3.** a) Skat. 37.3. zīmējumu.




37.3. zīm.

c) Sadalām kvadrātu  $24 \times 24$  16 kvadrātos ar izmēriem  $6 \times 6$  un katru no tiem sagriežam “stūrīšos” kā iepriekšējā gadījumā. Pēc tam aplūkojam 9 punktus, kuros savienojas 4 kvadrāti  $6 \times 6$ . Katrā no tiem griezumus izmainām tā, kā parādīts 37.4 zīmējumā.



37.4. zīm.

**37.4.** Sadalām regulāro trijstūri ar malas garumu 11 vairākās daļās (skat. 37.5. zīm.).



37.5. zīm.

Ar trijstūri  $T_3$  izmainām krāsu trijstūriem  $APU$ ,  $MPU$ ,  $BQR$ ,  $NQR$ ,  $CST$ ,  $LST$ ; ar trijstūri  $T_5$  izmainām krāsu trijstūriem  $PQL$ ,  $RMS$  un  $UNT$ . Rezultātā viss trijstūris  $ABC$  kļūs melns, jo visiem apgabaliem, izņemot  $MNL$ , krāsa mainīta vienu reizi, bet apgabalam  $MNL$  – trīs reizes.

Vēl, ja nepieciešams, jāpārkrāso atsevišķi nogriežņi un punkti.

**37.5.** Ja  $n = 1$ , tad 14 nav naturāla skaitļa kvadrāts.

Ja  $n = 2$ , tad  $144 = 12^2$ .

Ja  $n = 3$ , tad  $1444 = 38^2$ .


Ja  $n > 3$ , tad skaitļa pēdējie cipari ir 4444, un tas, dalot ar 16, dod atlikumā 12. Viegli pārbaudīt, ka naturāla skaitļa kvadrāts pēc moduļa 16 nedod atlikumu 12.

**37.6.** Pārveidojot, iegūstam

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{EE_1} &= \\ \left( \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \frac{1}{2} \overrightarrow{CD} \right) + \left( \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{DE} \right) + \left( \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \frac{1}{2} \overrightarrow{EA} \right) + \\ \left( \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \right) + \left( \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \right) &= \\ \frac{5}{2} \left( \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA} \right) &= \vec{0}. \end{aligned}$$

**37.7.** a) Pieņemsim, ka robeža  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  eksistē un ir vienāda ar  $a$ . Tad, pārejot uz robežu vienādībā  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_{n+1} - a_n) = 0$ , iegūstam  $2a - a = 0 \Rightarrow a = 0$ .

a) Prasītais apgabals attēlots 37.6. zīmējumā.




37.6. zīm.

**37.8.** Figūras laukumu apzīmēsim ar  $[F]$ . Tad (skat. 37.7. zīm.)

$$\begin{aligned} [ACE] &= [ABCDEF] - [ABC] - [CDE] - [AFE], \\ [BDF] &= [ABCDEF] - [BCD] - [DEF] - [FAB]. \end{aligned}$$


Trijstūru  $ABC$  un  $FAB$  laukumi ir vienādi, jo tiem ir kopīgs pamats  $AB$  un vienādi augstumi (Attālumi starp paralēlām taisnēm  $AB$  un  $FC$ ). Līdzīgi pierāda, ka  $[CDE] = [DEF]$  un  $[AFE] = [FAB]$ . No šejienes seko prasītā vienādība  $[ACE] = [BDF]$ .



37.7. zīm.

**37.9.** Identitāti pierāda, pakāpeniski konstruējot vienādības labajā un kreisajā pusē esošo funkciju grafikus. Atcerēsimies,  $y = |f(x)|$  grafiku iegūst, atspoguļojot pret  $Ox$  asi simetriski to funkcijas  $y = f(x)$  grafika daļu, kas atrodas zem  $Ox$  ass.

**37.10.** Iekrāsošim šaha dēlīti tā, kā parādīts 37.8. zīmējumā.



37.8. zīm.

Figūra var no baltā lauciņa pārvietoties tikai uz balto, un no melnā – tikai uz melno. Sākumā uz melnajiem lauciņiem atrodas tikai 1 figūra. Augšējā kreisajā stūrī ir 2 melni lauciņi, augšējā labajā – 4. Tas nozīmē, ka prasīto nevarēsīm izpildīt ne vienā, ne otrā gadījumā.

**36.11.** Pārveidojot, iegūstam


$$\begin{aligned} \sin x + \sin 3x + \sin 5x + \sin 7x &= \\ (\sin x + \sin 7x) + (\sin 3x + \sin 5x) &= \\ 2 \sin 4x \cos 3x + 2 \sin 4x \cos x &= \\ 2 \sin x (\cos 3x + \cos x) &= \\ 4 \cos x \cos 2x \sin 4x. \end{aligned}$$

**36.12.** Izdarām 2 svēršanas:

- 1) 2 un 3 kapeiku monētas salīdzinām ar 5 kapeiku monētu,
- 2) 1 un 2 kapeiku monētas salīdzinām ar 3 kapeiku monētu.

Ja kādā no svēršanām sviri atrodas līdzsvarā, tad viltota ir attiecīgi nesvērtā monēta. Pārbaudām, ka arī visos pārējos 4 gadījumos var viennozīmīgi noteikt viltoto monētu.

**36.13.** Apzīmēsim  $AD$  viduspunktu ar  $E$  (skat. 37.9. zīm.).



37.9. zīm.

$ME$  ir trijstūra  $ACD$  viduslīnija, tāpēc  $ME = \frac{1}{2} CD$ .

Līdzīgi  $EN = \frac{1}{2} AB$ . Tā kā  $AB = CD$ , tad  $ME = EN$ , un  $MEN$  ir vienādsānu trijstūris. Tātad  $\angle NME = \angle MNE$ . Tā kā  $ME \parallel CD$ , tad  $\angle NME = \angle XGD$ .  $\angle DGX = \angle NGC$  kā krustleņķi. Tāpēc  $\angle NME = \angle NGC$ .

Līdzīgā veidā iegūstam, ka  $\angle MNE = \angle BFM$ . Tāpēc  $\angle BFM = \angle MNE = \angle NME = \angle NGC$ , kas arī bija jāpierāda.

**37.14.** Doto polinomu pārveidosim formā

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = ax^2(x-1) + (a+b)x(x-1) + (a+b+c)(x-1) + (a+b+c+d).$$

Ja  $x$  vietā ievietojam skaitli, kas pārsniedz 1, tad visi saskaitāmie ir nenegatīvi, bet pirmais – pozitīvs. Pozitīva ir arī to summa. Tātad dotajam vienādojumam nav sakņu, kas lielākas par 1.

**37.15.** Ar  $Z_1$  apzīmēsim zēnu, kas dejojis ar visvairāk meitenēm. Ar  $M_2$  apzīmēsim jebkuru meiteni, kas nav dejojusi ar  $Z_1$ . Meitene  $M_2$  noteikti ir dejojusi ar kādu citu zēnu  $Z_2$ .

Meiteņu skaits, ar kurām ir dejojis  $Z_1$ , ir ne mazāks par meiteņu skaitu, ar kurām dejojis  $Z_2$ . Tā kā  $Z_2$  ir dejojis ar  $M_2$ , bet  $Z_1$  nē, tad eksistē meitene  $M_1$ , ar kuru  $Z_1$  ir dejojis, bet  $Z_2$  nav. Šie četri skolēni atbilst uzdevuma nosacījumiem.

**37.16.** Ar ekvivalentiem pārveidojumiem pārveidojam doto nevienādību

$$1 + \cos(\alpha - \beta) \geq \cos \alpha + \cos \beta \Leftrightarrow$$

$$1 + \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta \geq \cos \alpha + \cos \beta \Leftrightarrow$$

$$(1 - \cos \alpha) \cdot (1 - \cos \beta) + \sin \alpha \cdot \sin \beta \geq 0.$$

Šī nevienādība izpildās, jo  $\alpha$  un  $\beta$  ir šauri leņķi.

**37.17.** Pieņemsim pretējo, ka riņķa līnija nepieskaras nevienai 1987-stūra malai. Tad daudzstūra virsotne  $A_1$  atrodas ārpus riņķa līnijas. Tā kā riņķa līnija krusto malu  $A_1A_2$ , tad virsotne  $A_2$  atrodas riņķa līnijas iekšpusē. Līdzīgi --  $A_3$  atrodas ārpus riņķa līnijas, bet  $A_4$  atrodas riņķa līnijas iekšpusē. Šādi turpinot, iegūstam, ka  $A_{1987}$  atrodas ārpus riņķa līnijas, bet  $A_1$  atrodas riņķa līnijas iekšpusē. Iegūta pretruna, kas pierāda, ka uzdevuma apgalvojums ir pareizs.

**37.18.** a) Ar katru gājienu nenosvītoto skaitļu skaits samazinās par vienu. Tātad ir izdarīti 1986 gājieni. Pie dotajiem 1987 vieniniekiem tātad pierakstīti vēl 1986 skaitļi. Kopa uzrakstīti  $1987 + 1986 = 3973$  skaitļi.


b) Nenosvītoto skaitļu summa visu laiku paliek nemainīga. Tātad pēdējais skaitlis ir 1987.

b) Visu uzrakstīto skaitļu summa ir 23783.

**37.19.** Prasīto daudzskaldni iegūst no regulāra oktaedra, mazliet nobīdot tā virsotnes, lai plakne varētu šķēlēt visas tā skaldnes. Tādā gadījumā šķēlums būs astoņstūris.

**37.20.** Sadalām skolniekus "ciklos"  $A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots \rightarrow A_n \rightarrow A_1$ . Bultiņa  $A \rightarrow B$  nozīmē, ka  $B$  uzvilcis  $A$  cepuri. Atliek pierādīt, ka katram šādam ciklam divās dienās iespējams atgriezt cepures saviem īpašniekiem.

**37.21.** Novelkam  $NL \parallel AB$  (skat. 37.10. zīm.).



37.10. zīm.

No simetrijas pret nogriežņa  $MN$  vidusperpendikulu seko, ka  $CD = KL$ . Ja mēs pierādīsim, ka  $ABLK$  ir paralelograms, prasītais būs pierādīts.

Tā kā  $KN \parallel AM$ , tad  $AKNM$  ir riņķī ievilkta trapece; tāpēc tā ir vienādsānu un  $\angle MAK = \angle AMN$ . Līdzīgi pierāda, ka  $\angle MNL = \angle BLN$ . Tā kā  $\angle AMN = \angle MNL$ , tad  $\angle MAK = \angle BLN$ . Ņemot vērā šo vienādību un to, ka četrstūra  $ABLK$  malas  $AB$  un  $LK$  ir paralēlas, secinām, ka  $ABLK$  ir paralelograms. Prasītais pierādīts.

### 37.22. Apzīmēsim

$$S_i = (x_1 - y_1) + (x_2 - y_2) + \dots + (x_i - y_i). \text{ Tad}$$

$$-\left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}\right) + \left(\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} + \dots + \frac{1}{y_n}\right) =$$

$$\left(\frac{1}{y_1} - \frac{1}{x_1}\right) + \left(\frac{1}{y_2} - \frac{1}{x_2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{y_n} - \frac{1}{x_n}\right) =$$

$$\frac{x_1 - y_1}{x_1 y_1} + \frac{x_2 - y_2}{x_2 y_2} + \dots + \frac{x_n - y_n}{x_n y_n} =$$


$$\frac{S_1}{x_1 y_1} + \frac{S_2 - S_1}{x_2 y_2} + \dots + \frac{S_n - S_{n-1}}{x_n y_n} =$$

$$S_1 \left(\frac{1}{x_1 y_1} - \frac{1}{x_2 y_2}\right) + S_2 \left(\frac{1}{x_2 y_2} - \frac{1}{x_3 y_3}\right) + \dots + S_n \frac{1}{x_n y_n} \geq 0,$$

ko arī vajadzēja pierādīt.

**37.23.** Izvēlamies patvaļīgu rūtiņu  $A$  un apskatām tās 15 rūtiņas, kas atrodas vienā rindiņā vai vienā kolonnā ar  $A$ . Izpildām 15 atļautās maiņas ar “centriem” šajās 15 rūtiņās. Viegli pārbaudīt, ka rezultātā krāsu mainīs tikai rūtiņa  $A$ . Tā kā var mainīt patvaļīgas rūtiņas krāsu, tad var iegūt arī patvaļīgu krāsojumu.

**37.24.** Trijstūrī ievilktais riņķa līnijas rādiuss ir  $\frac{100}{50} = 2$  cm. Novelkam caur tās centru taisnes  $t_1, t_2, t_3$  paralēli trijstūra malām (skat 37.11. zīm.). Skaidrs, ka iesvītrotā paralelogramu laukumu summa mazāka par trijstūra laukumu, t.i., par  $100 \text{ cm}^2$ . Uzdevuma nosacījumos minētās taisnes  $m_1, m_2, m_3$  atšķēļ melnos paralelogramus, kas ir ceturtdaļa no atbilstošajiem iesvītrotajiem paralelogramiem.; tātad to laukumu summa ir mazāka par  $25 \text{ cm}^2$ .



37.11. zīm.

**37.25.** Pirmais spēlētājs var uzvarēt, izvēloties šādu stratēģiju. Ievērojot, ka sākotnējais akmeņu skaits nedalās ar 6, katrā gājienā viņš atņem 1, 2, 3, 4 vai 5 akmeņus tā lai atlikušais akmeņu skaits dalītos ar 6. Pēc otrā spēlētāja kārtējā gājiena atlikušo akmeņu skaits atkal nedalīsies ar 6, jo viņš nevar atņemt  $6k$  akmeņus ( $6k$  nav pirmskaitļa pakāpe, jo  $6k$  dalās ar 2 un 3). Rezultāta pēdējo akmeni paņems pirmais spēlētājs.

**37.26.** Ja  $a$  un  $b$  divi nogriežņi, kuru garumi nepārsniedz 1, tad aplūkosim tādu nogriežņu viduspunktu kopu  $c$ , kuriem viens galapunkts pieder  $a$ , bet otrs galapunkts pieder  $b$ . Arī  $c$  ir nogrieznis, kura garums ir  $\frac{a+b}{2}$  un, tātad, nepārsniedz 1. Tātad  $M_1$  var pārklāt ar 5 sākotnējiem nogriežņiem un 10 nogriežņiem, kas atbilst šo piecu nogriežņu pāriem (to savstarpējo viduspunktu kopām).

**37.27.** Vispirms pierāda, ka trijstūri, kas atrodas pie piecstūra malām ir līdzīgi, un pēc tam, ka tie ir vienādi.

**37.28.** Aplūkosim divus gadījumus.


- 1)  $A$  nav naturāla skaitļa kvadrāts. Tad  $A$  satur kādu pirmskaitli  $p$  nepāra pakāpē  $2k+1$ . Pietiekami lieliem  $x$  skaitlis  $x!$  dalās ar  $p^{2k+2}$ . Tas nozīmē, ka  $x! - A$  dalās ar  $p^{2k+1}$ , bet nedalās ar  $p^{2k+2}$ , un nevar būt naturāla skaitļa kvadrāts.
- 2)  $A$  ir naturāla skaitļa kvadrāts  $3^{2k} m^2$ , kur  $m$  nedalās ar 3. Pietiekami lieliem  $x$  skaitlis  $x!$  dalās ar  $3^{2k+1}$ . Ja izpildītos vienādība  $x! - A = y^2$ , tad izdalot šo vienādību ar  $3^{2k}$ , iegūstam  $3l = \frac{x!}{3^{2k}} = n^2 + m^2$ , kur  $n$  un  $m$  nedalās ar 3 ( $n^2 = \frac{y^2}{3^{2k}}$ ). Bet  $n^2 + m^2 \equiv 1+1 \pmod{3}$  nedalās ar 3.

**37.29.** Pakāpeniski pierāda šādus apgalvojumus



- 1) Sākot no  $n = 2$  virkne  $nx_n$  ir nedilstoša.
- 2) Tā ir ierobežota no augšas ar skaitli 1.
- 3) Tās robeža ir 1.

**37.30.** Aplūkojam patvaļīgu trijstūra  $XYZ$  stāvokli (37.12. zīm.).



37.12. zīm.

Ievērosim, ka  $\angle ABC = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$ , bet  $\angle YXZ = \frac{360^\circ}{n}$ . Tāpēc

$\angle ABC + \angle YXZ = 180^\circ$ . Tātad ap četrstūri  $YXZB$  var apvilkt riņķa līniju. Tā kā hordas  $XY$  un  $XZ$  ir vienādas, tad leņķi  $\angle XBY$  un  $\angle XBZ$  ir vienādi. Tātad punkts  $X$  atrodas uz leņķa  $ABC$  bisektrises.

Tātad  $X$  apraksta figūru, kas sastāv no  $n$  vienādiem nogriežņiem ar kopīgu galapunktu  $O$ . Nogriežņi atrodas uz taisnēm, kas savieno  $O$  ar  $n$ -stūra virsotnēm.

**37.31.** Vispirms pierāda, ka stars atspoguļojoties no trijstūra malām var iet tikai 6 virzienos  $\alpha, -\alpha, \alpha - 120^\circ, 120^\circ - \alpha, \alpha - 240^\circ, 240^\circ - \alpha$ . Tātad no minētajām 7 reizēm stars vismaz divas reizes caur punktu  $O$  gāja vienā un tajā pašā virzienā. Tātad kustība ir periodiska, un stars caur punktu  $O$  ies vēl bezgalīgi daudzas reizes.

**37.32.** Apzīmēsim  $i$ -tā posma projekciju garumus uz koordinātu asīm ar  $x_i, y_i, z_i$ , bet projekciju garumus koordinātu plaknēs ar  $a_i, b_i, c_i$ ; paša posma garums ir  $l_i$ . Tad

$$a_i^2 = y_i^2 + z_i^2, \quad b_i^2 = x_i^2 + z_i^2, \quad c_i^2 = x_i^2 + y_i^2;$$

$$l_i^2 = x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 = \frac{1}{2}(a_i^2 + b_i^2 + c_i^2).$$

Tāpēc

$$(a_i + b_i + c_i)^2 = a_i^2 + b_i^2 + c_i^2 + 2a_i b_i + 2a_i c_i + b_i c_i \leq$$

$$a_i^2 + b_i^2 + c_i^2 + (a_i^2 + b_i^2) + (a_i^2 + c_i^2) + (b_i^2 + c_i^2) =$$

$$3(a_i^2 + b_i^2 + c_i^2) = 6l_i^2 \quad \Rightarrow \quad a_i + b_i + c_i \leq \sqrt{6}l_i.$$

Summējot šīs nevienādības visiem  $i$ , iegūstam  $\frac{a+b+c}{l} \leq \sqrt{6}$ .

Šādu attiecību var iegūt, piemēram, slēgtai laužtai līnijai, kas savieno punktus  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 1, 1)$ ,  $(2, 2, 0)$ ,  $(3, 1, -1)$ ,  $(2, 0, -2)$ ,  $(1, -1, -1)$ .

**37.33.** Apzīmēsim 1987 ar  $p$  ( $p$  ir pirmskaitlis). Aplūkosim dotajā summā locekļus, kas atrodas vienādā attālumā no summas galiem.

$$\frac{1}{(n-2)(n-1)n} + \frac{1}{(p-n)(p-n+1)(p-n+2)} = \frac{(p-n)(p-(n-1))(p-(n-2)) + n(n-1)(n-2)}{n(n-1)(n-2)(p-n)(p-n+1)(p-n+2)}.$$

Skaitītāja atverot iekavas,  $n(n-1)(n-2)$  saīsinās; tātad skaitītājs dalās  $p$ . Šis  $p$  nesaīsinās ar saucēju, jo  $p$  ir pirmskaitlis, bet saucējā visi reizinātāji ir mazāki par  $p$ . Saskaitot  $k$  šādas daļas, arī rezultātā skaitītājs dalās ar  $p$ , un reizinātājs  $p$  nesaīsinās (jo kopsaucējā visi reizinātāji mazāki par  $p$ ).

**37.34.** Punktus tā var izkrāsot. Apgalvojumu pierāda ar matemātisko indukciju pēc punktu skaita  $n$ .

**37.35.** Apzīmēsim virsotnēs ierakstītos skaitļus ar  $A, B, C, D, E$ . Aplūkosim lielumu  $S = (A - C)^2 + (B - D)^2 + (C - E)^2 + (D - A)^2 + (E - B)^2$ .

Pārbaudām, ka operācijas rezultātā šis lielums samazinās. Tā kā  $S$  ir vesels nenegatīvs skaitlis, tad tas nevar pamazināties bezgalīgi ilgi. Tātad apskatāmais process nevar turpināties bezgalīgi.