

Materiāls ņemts no grāmatas: Andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (25.-51.) 2.kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi"

LATVIJAS RAJONU 25. OLIMPIĀDE

ATRISINĀJUMI

25.21. Apgalvojums seko no identitātes

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z) \cdot (x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz).$$

25.22. Ievērojot, ka $\sqrt{a^2} = |a|$, vienādojums pārveidojas formā

$$|x + 3| - 2 \cdot |x - 1| = 3.$$

Risinot to ar intervālu metodi, iegūstam atrisinājumus $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = 2$.

25.23. Ja Ilzei ir x gadu, bet Dacei y gadu, tad pirms $x - y$ gadiem Ilzei bija y , bet Dacei $2y - x$ gadi; tātad


$$x = 2 \cdot (2y - x).$$

Pēc $x - y$ gadiem Ilzei būs $2x - y$, bet Dacei x gadi; tātad

$$2x - y + x = 63.$$

No šiem diviem vienādojumiem iegūstam $x = 28$, $y = 21$.

25.24. Skat. 25.3. zīm.



25.3. zīm.

$$\begin{aligned} \angle YXV &= \angle AXD = 180^\circ - (\angle XAD + XDA) = \\ &= 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle DAB + \angle ADC) = 180^\circ - \frac{1}{2} \cdot 90^\circ = 90^\circ. \end{aligned}$$

Līdzīgi pierāda, ka arī pārējie četrstūra $XYZV$ leņķi ir taisni; tātad aplūkojamais četrstūris ir taisnstūris.

Tā kā AX ir trijstūra DAL bisektrise un augstums, tad DAL ir vienādsānu trijstūris un $\triangle DAX = \triangle LAX$.

Līdzīgi pierāda, ka $\triangle BZC = \triangle BZP$ un $\triangle BZC = \triangle SZC$.

No simetrijas seko, ka $\Delta LAX = \Delta SZC$.


Apvienojot šīs vienādības, iegūstam

$$\Delta LAX = \Delta BZP.$$

Tātad šo trijstūru augstumi ir vienādi, un $XZ \parallel LB$. Tā kā arī $LX \parallel BZ$, tad četrstūris $LXZB$ ir paralelograms. Tas nozīmē, ka

$$XZ = LB = AB - AL = AB - AD = a - b.$$

25.25. Skat. 25.4. zīm.



26.4. zīm.

Tā kā BD ir pieskare, tad OBD ir taisnleņķa trijstūris. Tāpēc

$$\angle DBC = 90^\circ - \angle ABO = 90^\circ - \angle OAC = \angle ACO = \angle BCD.$$

No šejienes seko, ka CDB ir vienādsānu trijstūris.

25.26. Ievēdīsim jaunu mainīgo $t = x + \frac{4}{x}$. Tad $x^2 + \frac{4}{x^2} = t^2 - 4$, un iegūstam

vienādojumu

$$t^2 + 6t - 27 = 0 \Rightarrow t_1 = 3, t_2 = -9.$$

Atbilde: $x \in \left\{ 1, 2, \frac{-9 \pm \sqrt{73}}{2} \right\}$.

25.27. Risinot nevienādību ar intervālu metodi, iegūstam atbildi

$$x \in (2, 5).$$

25.28. Ja motorlaivas ātrums ir v , attālums pa upi vienā virzienā – s , pirmās upes ātrums – x , bet otrās – y , tad pirmā motorlaiva brauc


$$\frac{s}{v-x} + \frac{s}{v+x} = \frac{2vs}{v^2-x^2} \text{ stundas,}$$

bet otrā motorlaiva $\frac{2vs}{v^2-y^2}$ stundas.

Ja $x > y$, tad $v^2 - x^2 < v^2 - y^2$ un $\frac{2vs}{v^2-x^2} > \frac{2vs}{v^2-y^2}$.

Tātad ceļu īsākā laikā veica motorlaiva upē ar mazāku straumes ātrumu.

25.29. Skat. 25.5. zīm.



25.5. zīm.

Pieņemam, ka trijstūrī ABC mala $AB = 10$ un mala $BC = 15$; BD ir bisektrise. Novelkam $DE \parallel AB$. Tad $\angle BDE = \angle DAB = \angle DBE$; tātad DEB ir vienādsānu trijstūris.


No trijstūra bisektrises īpašības seko vienādība $\frac{AD}{DC} = \frac{AB}{BC} = \frac{2}{3}$.

No Talesa teorēmas $\frac{AD}{DC} = \frac{BE}{EC}$. Apzīmēsim $BE = x$, tad $EC = 15 - x$ un

$$\frac{x}{15 - x} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = 6.$$

Tātad $BD < BE + EC = 6 + 6 = 12$.

25.30. Skat. 25.6. zīm.



25.6. zīm.

Novelkam perpendikulu OD pret trijstūra malu AB . Tad

$$OD = \frac{1}{3} \cdot DC = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{6}.$$

No dotā $OE = \frac{1}{3}$; tātad $DE = \sqrt{\left(\frac{a}{3}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{a}{6}$ un $FE = \frac{a}{3}$.

No šejienes redzams, ka riņķa līnija trijstūra malu sadala 3 vienādās daļās un arī riņķa līnijas loki ir vienādi.

Trijstūra un riņķa kopīgā daļa sastāv no 3 regulāriem trijstūriem ar malu $\frac{a}{3}$ un 3 sektoriem, ar centra leņķi $\frac{\pi}{3}$ (kopā tie veido pusriņķi ar rādiusu $\frac{a}{3}$). Kopīgais laukums ir $\frac{a^2(2\pi + 3\sqrt{3})}{36}$.

25.31. Dotās sistēmas

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{7}{\sqrt{xy}} + 1 \\ \sqrt{x^3y} + \sqrt{xy^3} = 78. \end{cases}$$

pirmo vienādojumu pareizinām ar $(\sqrt{xy})^2$ un atņemam otro vienādojumu; iegūstam

$$xy + 7\sqrt{xy} - 78 = 0 \Rightarrow \sqrt{xy} = 6.$$

Izdalot otro vienādojumu ar \sqrt{xy} , iegūstam

$$|x| + |y| = 13.$$

No šejienes ar ievietošanas metodi (un ievērojot, ka skaitļu x un y zīmes ir vienādas) iegūstam atrisinājumus: $\{(-9, -4), (-4, -9), (4, 9), (9, 4)\}$.

25.32. Izpildot pārveidojumus, iegūstam

$$\begin{aligned} \sin 10^\circ \cdot \sin 50^\circ \cdot \sin 70^\circ &= \frac{1}{2}(\cos 40^\circ - \cos 60^\circ)\sin 70^\circ = \\ \frac{1}{2} \cos 40^\circ \sin 70^\circ - \frac{1}{4} \sin 70^\circ &= \frac{1}{4}(\sin 30^\circ + \sin 110^\circ - \sin 70^\circ) = \\ \frac{1}{4} \cdot \sin 30^\circ &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

25.33. Dotās progresijas pirmo locekli apzīmējam ar a , bet tās kvocientu ar q .

Iegūstam vienādojumu sistēmu

$$\begin{cases} a \cdot (1 + q + q^2) = 3,5 \\ a^2 \cdot (1 + q^2 + q^4) = 5,25. \end{cases}$$

Pirmo vienādojumu kāpinām kvadrātā un atņemam no tā otro; iegūstam

$$2a^2q(1 + q + q^2) = 7.$$

Izdalot šo vienādību ar pirmo vienādojumu, iegūstam


$$2aq = 2.$$

Ievietojot $a = \frac{1}{q}$ pirmajā vienādojumā, iegūstam

$$1 + q + q^2 = 3,5 \cdot q \Rightarrow q \in \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}.$$

Atbilde: $a_1 = 2, q_1 = \frac{1}{2}; a_2 = \frac{1}{2}, q_2 = 2.$

25.34. Skat. 25.7. zīm.



25.7. zīm.


Četrplakņu kakta virsotni apzīmēsim ar S un kakta šķautnes ar $a, b, c, d.$

Plakņu Sab un Scd šķēluma taisni apzīmēsim ar l , bet plakņu Sad un Scd šķēluma taisni ar $t.$

Caur patvaļīgu taisnes a punktu A vilksim plakni, kas paralēla taisnēm l un $t.$ Tās krustpunkti ar pārējiem četrplakņu kakta stariem apzīmēti ar B, C un $D.$

Tad $AB \parallel l \parallel CD$ un $AD \parallel t \parallel BC.$ Tātad $ABCD$ ir paralelograms.

25.35. Skat. 25.8. zīm.



25.8. zīm.

Caur doto taisnes punktu A velkam perpendikulāru taisni un uz tās atzīmējam punktu $B,$ lai AB būtu vienāds ar dotā riņķa rādiusu. Tālāk savienojam B ar O un velkam nogriežņa BO vidusperpendikulu $XD.$ Punkts D būs meklējamās riņķa līnijas centrs. Tiešām, no konstrukcijas gaitas seko, ka BDO ir vienādsānu trijstūris; tātad


$$DA = DB - AB = DO - r = DY.$$

Tas nozīmē, ka riņķa līnija, kuras centrs ir punkts D un rādiuss DA pieskaras gan dotajai taisnei punktā A gan dotajai riņķa līnijai.

25.36. Apzīmējam meklējamā skaitļa x ciparu summu ar $S(x)$. Tā kā $5^4 = 625$ un $10^4 = 10000$, bet x ir četrципарu skaitlis, tad $6 \leq S(x) \leq 9$. Pārbaudot skaitļus $6^4, 7^4, 8^4, 9^4$ redzam, ka der tikai skaitlis $7^4 = 2401 = (2 + 4 + 0 + 1)^7$.

25.37. Trijstūra mediānu krustpunkta attālums līdz trijstūra malai ir vienāds ar $\frac{1}{3}$ no atbilstošā augstuma; tātad jāpierāda, ka pret garāku trijstūra malu atrodas īsāks augstums. Tiešām, ja $a > b$, tad $h_a = \frac{2S}{a} < \frac{2S}{b} = h_b$.

25.38. Skat. 25.9. zīm.



25.9. zīm.

Attālumu starp apotēmu ST un pamata diagonāli CB meklē kā augstumu OY trijstūrī SOX . Tā kā OX ir puse no trijstūra ABC augstuma, tad

$$OX = \frac{ab}{2\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ un}$$

$$OY = \frac{OX \cdot H}{\sqrt{OX^2 + H^2}} = \frac{Hab}{\sqrt{a^2b^2 + 4H^2(a^2 + b^2)}}.$$

Redzam, ka attālums nav atkarīgs no apotēmas un diagonāles izvēles.

25.39. Dotā izteiksme S pārveidojas formā

$$(\sin x + \cos x) \cdot (1 + 4 \sin 2x).$$

Tā kā $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin 2x$, tad

$$S = \pm \sqrt{1 + \sin 2x} \cdot (1 + 4 \sin 2x) = \pm 3 \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

25.40. Izpildot ekvivalentus pārveidojumus, iegūstam

$$\frac{x^3 + 2x}{x - 4} > -1 \Leftrightarrow \frac{x^3 + 3x - 4}{x - 4} > 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{(x-1)(x^2+x+4)}{x-4} > 0.$$

Tā kā $x^2 + x + 4 > 0$ visiem x , tad ar intervālu metodi atrisinām nevienādību

$$\frac{x-1}{x-4} > 0.$$

Atbilde: $x \in (1, 4)$.