



## Īsi atrisinājumi

5.1. a) Jā, var. Skat., piem., 1. zīm.



1. zīm.



2. zīm.

b) nevar; skaitlim 6 blakus var būt tikai 12.

5.1. Skat., piem., 2. zīm.



5.3. a) nē; izsvītrotot 5, palikušais skaitlis nevar dalīties ar 5.

b) jā; piem., skaitlis 154320.

5.4. Jā. Piemēram, izkrāsojam rūtiņas šaha galda secībā, baltajās rūtiņās ierakstām skaitļus no 1 līdz 8, bet melnajās – no 9 līdz 16.

5.5. Andra „kods” var būt divciparu, trīsciparu vai četrsciparu. To atšifrējot, problēmas var radīt tikai trīsciparu kodi, pie tam tikai tādi, kam pēdējais cipars ir 1 vai 2; tad priekšpēdējais cipars noteikti ir 1. Tā kā janvārī ir 31 diena, iegūstam 111; 211; 311; tā kā februārī ir augstākais 29 dienas, iegūstam 112 un 212. Tātad pavisam ir 5 šādi kodi.


6.1. Skat., piem., 3. zīm.



3. zīm.

6.2. a) nē. 12 figūriņām ir pats lielākais  $12 \cdot 4 = 48 < 7 \cdot 7$  rūtiņas;

b) jā. Skat., piem., 4. zīm.



4. zīm.

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
R1	X	X	X			
R2	X			X	X	
R3		X		X		X
R4			X		X	X

5. zīm.

6.3. a) nē. Ja kastu būtu  $n$ , tad rūķīšu piedalīšanos kopā būtu gan  $2 \cdot n$ , gan  $5 \cdot 3$ . Bet naturālam  $n$  nevar pastāvēt vienādība  $2n = 15$ .

b) jā. Skat., piem., 5.zīm.

6.4. Nē. Spriežam no pretējā. Šķirojam divas iespējas:

- a) saskaitīšanā pārnesums nerodas. Tad katrā šķirā tiek saskaitīts pāra cipars un nepāra cipars. Tātad tiem jābūt vienādā skaitā, bet 7 nedalās ar 2.
- b) kādā šķirā rodas pārnesums. Aplūkojam pašu labējo no šādām šķirām. Tur saskaitīti divi piecinieki (citādi summu, kas ir vismaz 10, iegūt nevar); bet tad summā šajā šķirā rodas pāra cipars 0.

6.5. Pierādīsim, ka pietiek ar 1 svēršanu. Uzliekam uz kausiem pa 67 monētām. Ja svāri nav līdzsvarā, vajadzīgās monētu kaudzītes atrodas uz kausiem. Ja svāri ir līdzsvarā, tad par meklējamām kaudzītēm der malā palikušās 66 monētas un jebkuras 66 monētas no viena svaru kausa. Pierādīsim to.

Tiešām, ja malā palikušās 66 monētas kopā sver tikpat, cik 66 monētas no 1. kausa, tad šajos komplektos ir vienāds skaits (apzīmēsim to ar  $x$ ) „vieglo monētu”. Tad uz 1. kausa atrodas vai nu  $x$ , vai  $x + 1$  „vieglā” monēta (atkarībā no tā, vai 67-ā monēta uz šī kausa ir „smagā” vai „vieglā”). Atbilstoši uz otrā svaru kausa ir vai nu  $x$ , vai  $x + 1$  „vieglā monēta” (jo kausi atrodas līdzsvarā). Tātad pavisam vieglo monētu ir vai nu  $2x + x = 3x$ , vai  $2(x + 1) + x = 3x + 2$ . Bet ne vienādojumam  $3x = 100$ , ne vienādojumam  $3x + 2 = 100$  nav atrisinājuma veselos skaitļos. Iegūta pretruna, tātad mūsu pieņēmums nepareizs un malā palikušo monētu svārs noteikti atšķiras no 1. kausa jebkuru 66 monētu kopējā svāra. Tieši tāpat pierāda, ka malā palikušo monētu kopējais svārs noteikti atšķiras no 2. kausa jebkuru 66 monētu kopējā svāra.

Skaidrs, ka pavisam bez svēršanas prasītās monētu kaudzītes atrast nevar. Tātad meklējamais minimums ir 1.

---

7.1. Visus:  $n = (n^7)^3 : (n^4)^5$ .


7.2. a) ar katru gājienu skaitļu skaits samazinās par 1. Tā kā tas dilst no 2009 līdz 1, tad pavisam izdarīs  $2009 - 1 = 2008$  gājienu.

b) uzrakstīto skaitļu summa paliek nemainīga. Tāpēc pēdējais palikušais skaitlis būs 2009.

7.3. a) pieņemsim, ka  $a$  dalītāji ir  $1 < a_1 < a_2 < a$ , bet  $b$  dalītāji ir  $1 < b_1 < b_2 < b_3 < b_4 < b$ . Tad  $1 < b_1 < b_2 < b_3 < b_4 < b < a_1 b < a_2 b < ab$  ir 9 dažādi skaitļa  $ab$  dalītāji.


b) jā; piemēram, ja  $a = 8$ ,  $b = 32$  un  $ab = 256$ .

7.4. a) var nokrāsot 6 punktus; skat., piem., 6.zīm.




b) pierādīsim, ka 7 vai vairāk punktus nokrāsot nevar. Pieņemsim no pretējā, ka tas izdevies. Šķirojam gadījumus.

b1) ir kolonna, kurā nokrāsoti 3 vai vairāk punkti. Tātad tajās rindās, kurās ir šie punkti, citu nokrāsotu punktu nav. Tāpēc vēl var nokrāsot vai nu 0, vai augstākais 3 punktus (skat. 7.zīm.).



7.zīm.

b2) nevienā kolonnā nav nokrāsoti vairāk par 2 punktiem. Ņemam kolonnu  $\alpha$ , kurā nokrāsoti 2 punkti (tāda noteikti eksistē); pieņemsim, ka tie ir rindās  $\beta$  un  $\gamma$ . Citi nokrāsotie punkti var atrasties tikai ārpus  $\alpha$ ,  $\beta$  un  $\gamma$ . Tur pavisam ir 6 taisnstūra režģa veidā izvietoti punkti (skat. 8.zīm.).



8.zīm.

Viegli pārbaudīt: lai kurus 5 punktus no šiem 6 nokrāsotu (t.i., tikai vienu atstātu nenokrāsotu), uzdevumā minētais taisnleņķa trijstūris eksistē. Iegūta pretruna.

**7.5.** Sprīdītis nosūta vienu rūķīti A izlūkos pa vienu ceļu, divus citus rūķīšus B un C izlūkos pa otru ceļu, bet pats dodas izlūkos pa trešo ceļu. Visiem pieteikts pēc divām dienām atgriezties ceļu sazarojuma vietā.

Ja Sprīdītis konstatē, ka Laimīgā Zeme sasniedzama pa viņa izvēlēto ceļu, tad viņš rūķīšus nemaz neaptauja, bet kopā ar visiem dodas uz mērķi. Aplūkosim gadījumus, kad Sprīdītis savā izlūkgājienā Laimīgo Zemi nav sasniedzis. Tad viņš jautā visiem rūķīšiem, vai viņi ir sasnieguši Laimīgo Zemi. Šķirojam divas iespējas.

a) B un C atbildes ir dažādas. Tātad viens no viņiem ir neuzticams. Tātad A noteikti runā patiesību. Balstoties uz A teikto un sava izlūkgājiena rezultātiem, Sprīdītis izvēlas pareizo ceļu;

b) B un C atbildes ir vienādas. Tad tās abas nevar būt nepareizas; tātad tās ir pareizas. (Ievērojiet: mēs neapgalvojām, ka B un C abi vienmēr runā patiesību!). Balstoties uz B un C teikto un sava izlūkgājiena rezultātiem, Sprīdītis izvēlas pareizo ceļu.

**8.1.** Apskatīsim divus iespējamus risinājumus.

**A.** Sadalīsim katrā rūtiņā ierakstīto skaitli divos saskaitāmajos, kā parādīts 9.zīm.

1+0	1+2	1+4	1+6
9+0	9+2	9+4	9+6
17+0	17+2	17+4	17+6
25+0	25+2	25+4	25+6

9.zīm.

Ievērosim, ka katrā rindiņā ir vienādi pirmie saskaitāmie, bet katrā kolonnā – otrie. Tā kā no katras **rindiņas** ņemta viena rūtiņa, tad visu izvēlēto skaitļu **pirmo** saskaitāmo summa ir  $1+9+17+25=52$ ; līdzīgi, tā kā no katras kolonnas ņemta viena rūtiņa, tad visu izvēlēto skaitļu **otro** saskaitāmo summa ir  $0+2+4+6=12$ . Atliek ievērot, ka  $52+12=64$ .

**B.** Minētās 4 rūtiņas var izvēlēties tikai 24 veidos; visas šīs summas var tieši aprēķināt un konstatēt, ka katra no tām ir 64.

**8.2.** No nevienādības  $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 > 0$ , atverot iekavas, seko  $a^2 + b^2 + c^2 > ab + ac + bc$ .

8.3. Ievērosim, ka  $113^{113} = (113^4)^{28} \cdot 113$  un  $113^4$  beidzas ar ciparu 1 ( $3^4 = 81$ ). Tāpēc  $113^{113}$  beidzas ar ciparu 3. Līdzīgi  $19^{19} = (19^2)^9 \cdot 19 = (\dots)^9 \cdot 19$  beidzas ar ciparu 9. Tāpēc  $113^{113} - 19^{19}$  beidzas ar ciparu 4.

8.4. Pieņemsim, ka trešajā svēršanā uz kreisā kausa akmeņu kopējā masa bija  $x$ , bet uz labā kausa –  $y$ . Pārējie akmeņi, kas pirmajā svēršanā bija uz kreisā kausa, otrajā svēršanā bija uz labā, un otrādi. Apzīmējot šīs kopējās masas attiecīgi ar  $a$  un  $b$ , iegūstam


$$a + x = b + y$$

$$b + x = a + y$$

Saskaitot šīs vienādtības, iegūstam vajadzīgo.

8.5. Šķirojam 3 gadījumus.


I



$$3 \cdot AC = 3 \cdot AB > AB.$$

10.zīm.


II



$$3 \cdot AC > 2 \cdot AC = AC + CB > AB.$$

11.zīm.

III



Tā kā  $\angle ABE = 60^\circ$  un  $BA = BE$ , tad  $\triangle ABE$  ir vienādmalu. Tāpēc  $3AC = AC + CD + DE > AE = AB$ .


12.zīm.

9.1. Saskaņā ar teorēmu par slīpnes un perpendikula garumu  $CA \geq h_c \geq 13$ . Tāpēc

$$L(ABC) = \frac{1}{2} AC \cdot h_b \geq \frac{1}{2} \cdot 13 \cdot 12 = 78. \text{ Vērtība } L(ABC)=78 \text{ tiek sasniegta, piemēram,}$$

taisnleņķa trijstūrī ABC, kur  $AB=12$ ;  $AC=13$ ;  $\angle A=90^\circ$ . Šis trijstūris apmierina uzdevuma

$$\text{nosacījumus: } h_b=AB=12, h_c=AC=13, h_a = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{12 \cdot 13}{\sqrt{313}} > \frac{12 \cdot 13}{18} > 5 \text{ (skat. 4.zīm.)}$$




4. zīm.


**9.2.** Apzīmējam četrциpuru skaitļa  $n$  pirmo divu ciparu veidoto skaitli ar  $a$ , bet pēdējo divu ciparu veidoto skaitli ar  $b$ . Tad  $n=100a+b$ , tāpēc iegūstam  $100a+b=b^2$  un  $25 \cdot 4 \cdot a=b(b-1)$ . Tā kā  $\text{LKD}(b,b-1)=1$ , tad vai nu  $b$ , vai  $b-1$  dalās ar 25. Tāpēc  $b$  varbūt iespējamās vērtības ir 00; 01; 25; 26; 50; 51; 75; 76. Atbilstoši  $a$  vērtība iznāk divciparu naturāls skaitlis tikai pie  $b=76$ , tad  $a=57$ . Tāpēc ir tikai viens meklējamais skaitlis  $n=5776$ .

**9.3.** Atceramies, ka

- a) pieskare ir perpendikulāra rādiusam, kura galapunktā tā novilkta,
  - b) tātad taisne, kas novilkta perpendikulāri rādiusam tā galapunktā, ir pieskare.
1. Pieņemsim, ka  $R^2+r^2=d^2$ . Novelkam rādiusus uz r.l. krustpunktu A. Tad  $OA^2+SA^2=OS^2$ , tātad pēc Pitagora teorēmai apgrieztās teorēmas  $\triangle OAS$  ir taisnleņķa. Tāpēc taisne SA (pēc augšminētā b) punkta) ir r.l.  $w_1$  pieskare, un tāpat taisne OA ir  $w_2$  pieskare. Tātad abas pieskares punktā A ir savstarpēji perpendikulāras.



5. zīm.



6. zīm.

2. Pieņemam, ka pieskares krustpunktā A ir savstarpēji perpendikulāras (6. zīm.). Tā kā  $t \perp l$ , tad  $t$  satur  $w_2$  rādiusu, tātad iet caur S. Līdzīgi  $l$  iet caur O. Tāpēc  $\triangle OAS$  ir taisnleņķa, un no Pitagora teorēmas seko vajadzīgais.


**9.4.** Apzīmēsim saknes ar  $x_1$  un  $x_2$ , kur  $x_1 < x_2$ . Tad pie  $x \notin (x_1; x_2)$   $x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2) \geq 0 > -1$ . Ja  $x \in (x_1; x_2)$ , tad

$$|x^2 + px + q| = |(x - x_1)(x_2 - x)| = (x - x_1) \cdot (x_2 - x) \leq \left( \frac{(x - x_1) + (x_2 - x)}{2} \right)^2 = \left( \frac{x_2 - x_1}{2} \right)^2 \leq \left( \frac{2}{2} \right)^2 = 1,$$

no kā seko vajadzīgais.

**9.5.** a) Pieņemsim pretējo, ka tādu divu cilvēku nav. Tā kā cilvēku ir tieši  $n$  un paziņu daudzums vienam cilvēkam var būt 0; 1; 2; ...;  $n-1$  (t.i., tieši  $n$  dažādas vērtības), tad katrai šai vērtībai „jārealizējas”; t.sk. jārealizējas arī paziņu daudzumiem 0 un  $n-1$ . Bet tas nav iespējams: ja ir kāds, kam nav neviena paziņas, tad nevar būt neviena, kas pazīst visus  $n-1$  citus. Iegūta pretruna.

- b) Pie  $n=4$  var gadīties, ka trešā cilvēka nav: skat, piem., 7. zīm., kur punkti attēlo cilvēkus, bet līnijas – pazišanās.



7. zīm.


Pie  $n=2009$  tādi cilvēki noteikti atradīsies. Pieņemsim pretējo: nekādiem diviem cilvēkiem ar vienādiem paziņu daudzumiem minētā trešā cilvēka nav. Ņemsim divus cilvēkus A un B ar vienādiem paziņu daudzumiem (tādi eksistē saskaņā ar a) punktu). Katru no pārējiem  $n-2$  cilvēkiem pazīst tieši viens no A un B, tāpēc  $n-2$  jādalās ar 2 (citādi A un B paziņu daudzumi neiznāktu vienādi). Tāpēc  $n$  jābūt pāra skaitlim. Bet 2009 ir nepāra.

**10.1.** Šādam skaitlim jādalās gan ar 11 (jo  $(n+1)+(n+2)+\dots+(n+10)+(n+11)=11(n+6)$ ), gan ar 13, gan ar 6 (jo  $(n+1)+(n+2)+\dots+(n+12)=6((n+1)+(n+12))$ ). Tā kā 11, 13 un 6 ir pa pāriem savstarpēji pirmskaitļi, tad tam jādalās ar  $6 \cdot 11 \cdot 13 = 858$ . Mazākais naturālais skaitlis, kas dalās ar 858, ir 858. Viegli pārbaudīt, ka visi 11 (12; 13) saskaitāmie iznāk **naturāli** skaitļi (pārbaude nepieciešama).

**10.2.**  $L(MBN) = L(MIB) + L(NIB) = \frac{1}{2}r \cdot (MB + BN)$ ;  $L(ABC) = \frac{1}{2}r \cdot (AB + BC + CA)$ . Ja

$L(MBN) = \frac{1}{2}L(ABC)$ , tad no  $\frac{1}{2}r(MB + BN) = \frac{1}{4}r(AB + BC + CA)$  seko

$MB + BN = \frac{1}{2}(AB + BC + CA)$ , k.b.j.



8. zīm.


**10.3.** Tā kā  $a^2$  dalās ar  $b$  un  $a$  dalās ar  $a$ , tad  $a^3 = a^2 \cdot a$  dalās ar  $b \cdot a$ . Līdzīgi pierāda, ka  $b^3$  dalās ar  $ab$ . Tāpēc arī  $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$  dalās ar  $ab$ . Ja  $a=2$  un  $b=4$ , tad  $(a+b)^2 = 36$  nedalās ar  $a \cdot b = 8$ .

**10.4.** Pārveidojam vienādojumu par  $x + y + z = 2\sqrt{x-1} + 4\sqrt{y-4} + 6\sqrt{z-9}$  un tālāk par  $(\sqrt{x-1}-1)^2 + (\sqrt{y-4}-2)^2 + (\sqrt{z-9}-3)^2 = 0$ . Tā kā kvadrāti ir nenegatīvi, tad katrs no tiem ir 0. No šejienes viegli iegūt  $x=2$ ;  $y=8$ ;  $z=18$ .

**10.5.** Atbilde: ar 100 pieskāšanās reizēm.

Risinājums: a) pieskaroties katrai spuldzei 1 reizi, katra spuldze maina savu stāvokli 19 (nepāra skaitu) reizi, tātad gala rezultātā no izslēgtas kļūst par ieslēgtu.

b) pierādīsim, ka 100 ir meklētais minimums. Skaidrs, ka varam apskatīt situāciju, kad katrai spuldzei vai nu nepieskaras nemaz, vai pieskaras vienu reizi, jo divas pieskāšanās vienai spuldzei savstarpēji anulējas. Pieņemsim no pretējā, ka kādai spuldzei  $S$  nepieskaras.



9. zīm.


Tad rindā  $\alpha$  un kolonnā  $\beta$  kopā jābūt nepāra skaitam pieskaršanos; varam pieņemt, ka rindā  $\alpha$  ir nepāra skaits pieskaršanos. Šo pieskaršanos dēļ katra spuldze rindā  $\alpha$  mainījusi savu stāvokli nepāra skaitu reižu; tāpēc katrā kolonnā jābūt pāra skaitam pieskaršanos ārpus  $\alpha$ . Tāpēc kopējais pieskaršanos skaits ārpus  $\alpha$  ir pāra skaitlis. Pieskaitot vēl pieskāršanās rindā  $\alpha$ , kopējais pieskaršanos skaitis ir nepāra skaitlis. Katra pieskāršanās izsauc izmaiņas 19 spuldzēs, tāpēc kopējais izmaiņu skaits  $S$  ir nepāra skaitlis. Bet katra no 100 spuldzēm maina savu stāvokli nepāra skaitu reižu, tāpēc  $S$  kā 100 nepāra skaitļu summa ir pāra skaitlis. Iegūta pretruna.

11.1. a) jā, var; skat. 10.zīm.


b) nē, nevar. Pieņemam, ka tas izdevies. Apzīmējam skaitļus izrakstīšanas secībā ar  $a_1; a_2; \dots; a_7$ ; varam pieņemt, ka  $a_1 < a_2$ . Tad jābūt  $a_2 > a_3, a_3 < a_4, a_4 > a_5, a_5 < a_6, a_6 > a_7, a_7 < a_1, a_1 > a_2$  – pretruna. (Izšķirošais bija tas, ka 7 – nepāra skaitlis.)

c) nē, nevar. Apskatām piecas desmitstūra virsotnes, kas veido regulāru piecstūri, un spriežam par tām kā b) gadījumā.

d) jā, var. Skat. 11. zīm.




10. zīm.




11. zīm.

**Komentārs.** Uzdevuma prasības ir izpildāmas tad un tikai tad, ja  $n$  ir divnieka pakāpe ar naturālu kāpinātāju. Ja  $n$  dalās ar kādu nepāra pirmskaitli  $p$ , apskatām regulāru  $p$ -stūri ar virsotnēm  $n$ -stūra virsotnēs un spriežam kā b) gadījumā. Induktīvā pāreja no  $n=2^k$  uz  $n=2^{k+1}$  shematiski attēlota 12.zīm.; ar tās palīdzību no 13. zīm. iegūts 10. zīm. un no 10. zīm. – 11. zīm.



12. zīm.



13. zīm.

**11.2.** Ja  $(x;y)$  ir atrisinājums, tad arī  $(-x;y)$  ir atrisinājums. Tāpēc sākumā apskatām tikai gadījumu  $x \geq 0$ . Vienādojumu var pārveidot par  $x^2y + 10 = 14y$  un tālāk par  $y = \frac{10}{14 - x^2}$ . Tā kā  $y$  jābūt veselam un  $y \neq 0$ , tad jābūt  $|14 - x^2| \leq 10$ , no kurienes  $4 \leq x^2 \leq 24$ ; tā kā apskatām  $x \geq 0$ , tad  $2 \leq x \leq 4$ . Pārbaudot visas iespējas, iegūstam atrisinājumus  $(2;1)$ ,  $(-2;1)$ ,  $(3;2)$ ,  $(-3;2)$ ,  $(4;-5)$ ;  $(-4;-5)$ .

**11.3.** Šķirojam divus gadījumus.

**A.**  $x \geq 2$ . Tad nevienādība kļūst par  $|x - 2 - x| - 9 \leq 2009$  jeb  $7 \leq 2009$ . Tātad visas šīs  $x$  vērtības der.

**B.**  $x < 2$ . Tad nevienādība kļūst par  $|2 - 2x| - 9 \leq 2009$  un tālāk par  $9 - 2009 \leq |2x - 2| \leq 9 + 2009$ , no kurienes  $|2x - 2| \leq 2018$  un  $|x - 1| \leq 1009$ . Tāpēc  $1 - 1009 \leq x \leq 1 + 1009$  jeb  $-1008 \leq x \leq 1010$ ; der visi  $x$ , kur  $-1008 \leq x < 2$ . Apvienojot visas atbildes, iegūstam  $x \geq -1008$ .

**11.4.** Apzīmēsim  $\triangle ABC$  malas garumu ar  $a$ . No teorēmas par sekanšu nogriežņu reizinājumiem iegūstam

$$AM \cdot a = AN(a - LC) \text{ un}$$

$$CL \cdot (a - AN) = CK \cdot a.$$

Saskaitot abas vienādības un veicot elementārus algebriskus pārveidojumus, iegūstam vajadzīgo.

**11.5.** Ņemam vienu no punktiem  $P$  un šķirojam divas iespējas.

**A.** No  $P$  iziet 3 balti un 3 sarkani nogriežņi. Ja kaut divus šo 3 balto nogriežņu galapunktus arī savieno balts nogrieznis, esam ieguvuši baltu trijstūri. Ja tos visus savieno sarkani nogriežņi, iegūstam sarkanu trijstūri.

Līdzīgi otru vienkrāsainu trijstūri iegūstam, apskatot triju sarkano nogriežņu galus.

**B.** No  $P$  iziet vismaz 4 vienas krāsas nogriežņi (varam pieņemt, ka balti). Apskatām to galus  $M, N, K, L$ . Ja starp nogriežņiem, kas savieno  $M, N, K$  un  $L$ , ir kaut divi balti, iegūstam 2 baltus trijstūrus. Ja vismaz 5 no tiem ir sarkani – varam pieņemt, ka visi, izņemot varbūt  $MN$  – iegūstam sarkanus trijstūrus  $KLM$  un  $KLN$ .

**Komentārs 1.** To, ka iegūtās konfigurācijas tiešām ir trijstūri, nevis „divkārši nogriežņi”, un to, ka nogriežņi nekrustojas (kas radītu nesekaidrības par to, kā nokrāsots krustpunkts), garantē uzdevumā dotais par punktu izvietojumu telpā. Starp citu, pirmais nosacījums seko no otrā un uzdevuma tekstā pieminēts tikai, lai „neatšķaidītu” risinājumā kombinatoriskos spriedumus.

**Komentārs 2.** Vairāk papūloties, var pierādīt, ka ir vismaz 4 vienkrāsaini trijstūri.



**12.1.** Tā kā  $|\cos t| \leq 1$ , tad  $\cos(x^2) + \cos(y^2) - \cos(xy) \leq 1 + 1 - (-1) = 3$ . Lai pierādītu stingro nevienādību, jāpierāda, ka nevar vienlaicīgi būt  $\cos x^2 = 1$ ,  $\cos y^2 = 1$ ,  $\cos(xy) = -1$ . Pieņemsim pretējo. Tad  $x^2 = 2\pi m$ ,  $y^2 = 2\pi k$ ,  $xy = \pi(2l+1)$ ,  $n, k, l \in \mathbb{Z}$ . No tā seko, ka  $x^2 y^2 = 4\pi^2 nk$  un  $(xy)^2 = \pi^2 \cdot (2l+1)^2$ . No tā seko, ka  $4nk = (2l+1)^2$  Bet pāra skaitlis nevar būt vienāds ar nepāra skaitli – pretruna.

**12.2.** Ja  $p=2$ ,  $n=9$ ; ja  $p=3$ ,  $n=49$ ; ja  $p=5$ ,  $n=513$ . Pieņemsim, ka  $p>5$ . Tad  $n = (p-2)(p-1)(p+1)(p+2) + 9$  un  $p-2$ ;  $p-1$ ;  $p$ ;  $p+1$ ;  $p+2$  ir 5 pēc kārtas ņemti naturāli skaitļi, tāpēc viens no tiem dalās ar 5. Tā kā  $p>5$ , tad tas nav  $p$ ; tāpēc  $(p^2-1)(p^2-4)$  dalās ar 5. Skaitlis  $p^2-1$  ir pāra, tāpēc  $(p^2-1)(p^2-4)$  dalās ar 10. Tāpēc  $(p^2-1)(p^2-4)+9$  pēdējais cipars ir 9. Tā kā pie  $p>5$  iznāk  $n>10$ , tad ir vēl citi cipari bez pēdējā, tāpēc ciparu summa ir lielāka par 9. Tātad mazākā iespējamā  $n$  ciparu summa ir 9, un tā tiek sasniegta pie  $p=2$  un  $p=5$ .

**12.3.** Ar ekvivalentiem pārveidojumiem iegūstam  $\frac{1}{x}(x - \sqrt{2x+1})^2 + \frac{1}{y}(y - \sqrt{2y+1})^2 = 0$ . Tā kā

$x>0, y>0$ , tad  $x - \sqrt{2x+1} = 0$  un  $y - \sqrt{2y+1} = 0$ , no kurienes viegli seko  $x = y = 1 + \sqrt{2}$ .

**12.4.** Apzīmējam  $\triangle ABC$  malas garumu ar  $a$ . No teorēmas par hordu nogriežņu reizinājumiem iegūstam

$$AM(a+CK) = AN \cdot a \text{ un}$$


$$CL \cdot a = CK \cdot (AM+a).$$

Saskaitot šīs vienādības un veicot ekvivalentus pārveidojumus, iegūstam vajadzīgo.

**12.5. Atbilde:** 29.

Risinājums. Četras paralēlskaldņa virsotnes, kas neatrodas vienā plaknē, var izvēlēties četros būtiski dažādos veidos atkarībā no tā, kā tās savienotas vai nav savienotas ar šķautnēm.:

- viena virsotne un trīs ar to savienotās (14. zīm.),
- četras virsotnes „ķēdītē” (15. zīm.),
- trīs virsotnes „ķēdītē” un viena virsotne pretējā skaldnē (16. zīm.),
- četras izolētas virsotnes (17. zīm.).



14. zīm.

15. zīm.

16. zīm.

17. zīm.

- Atkarībā no tā, kurš no 4 dotajiem punktiem ir A, iegūstam 4 paralēlskaldņus.
- Atkarībā no tā, kuri divi no dotajiem punktiem ir B un C un kurš no abiem atlikušajiem savienots ar šķautni ar B, bet kurš – ar C, iegūstam  $C_4^2 \cdot 2 = 12$  paralēlskaldņus.
- Atkarībā no tā, kuri 3 no dotajiem punktiem ir vienā skaldnē un kurš no tiem ir „vidējais ķēdītē”, iegūstam  $C_4^3 \cdot 3 = 12$  paralēlskaldņus.
- Patvaļīgā veidā sadalot punktus pāros, šie pāri nosaka divas šķērsas taisnes. Caur tām jāvelk savstarpēji paralēlas skaldņu plaknes; to var izdarīt vienā vienīgā veidā. Tāpēc tāds paralēlskaldnis ir tikai viens. Atliek ievērot, ka  $4+12+12+1=29$ .

---

---

### Īsi norādījumi vērtēšanai

---

5.1. Par katru daļu – 5 punkti.

5.3. Par katru daļu – 5 punkti.

5.4. Par nepareiziem piemēriem – ne vairāk kā 2 punkti.

5.5. Par katru pareizu piemēru 1 punkts; pārējie 5 punkti „par spriedumiem”.

---

6.1. Par katru daļu 5 punkti. Pietiek ar zīmējumu. Par nepareizu piemēru  $\leq 1$  punkts.

6.2. Par katru daļu 5 punkti.

6.3. Par katru daļu 5 punkti.

6.4. Ja nav apskatīta viena no abām principiāli dažādajām iespējām –  $\leq 5$  punkti. Par atsevišķiem piemēriem  $\leq 2$  punkti.

6.5. Par stratēģiju ar vairāk kā 1 svēršanu, pat ja tā ir pareiza – ne vairāk par 5 punktiem.

---

7.1. Par atsevišķiem piemēriem  $\leq 2$  punkti.

7.2. Par katru daļu 5 punkti.

7.3. Par katru daļu 5 punkti.

7.4. Par pareizu piemēru – 5 punkti.

7.5. Par stratēģiju ar  $>3$  dienām – ne vairāk kā 5 punkti.

---

8.1. Par atsevišķu piemēru pārbaudi, ja netiek pārbaudīti visi gadījumi – ne vairāk kā 5 punkti.

8.2. Par skaitliskiem piemēriem – ne vairāk kā 2 punkti.

8.3. Par pareizu ideju ar kļūdu aprēķinos – līdz 5 punktiem.

8.4. Par atsevišķu piemēru apskatīšanu – līdz 2 punktiem.

8.5. Par viena gadījuma apskatīšanu – līdz 3 punktiem,  
par divu gadījumu apskatīšanu – līdz 6 punktiem.

---

9.1. Par piemēru ar laukumu 78 – 3 punkti.

No jebkura risinājuma, ja netiek pārbaudīts, vai visi uzdevuma nosacījumi izpildīti, jānoņem 1 punkts.

9.2. Par pareizu atbildi bez pamatojuma, ka tā ir vienīgā – 5 punkti.

9.3. Par pierādījumu tikai vienā virzienā – līdz 7 punktiem.

9.4. Par konkrētiem piemēriem – līdz 2 punktiem.

9.5. a) daļa – 5 punkti; b) daļā par gadījumu  $n=4$  – 2 punkti.

---

10.1. Par pareizu atbildi vienu pašu – 2 punkti.

Ja nav atsauces uz to, ka 11; 13; 6 ir pa pāriem savstarpēji pirmskaitļi, jānoņem 1 punkts.

Ja nav vismaz pieminēts, ka izdarīta pārbaude, vai sasummētie skaitļi iznāk naturāli, jānoņem 2 punkti.

**10.2. Nav jāprasa,** lai būtu aptverti arī gadījumi, kuros taisne novietota citādi nekā dotajā zīmējumā.

**10.3.** Par a) daļu – 6 punkti.

**10.4.** Par pārveidojumiem, kas neved pie mērķa – ne vairāk par 3 punktiem.

**10.5.** Par novērojumu un pamatojumu, ka ar 100 pieskārieniem pietiek – 5 punkti.

---

**11.1.** a) 2 punkti; b) 2 punkti; c) 3 punkti; d) 3 punkti.

**11.2.** Par visu atrisinājumu uzrādīšanu pat bez mēģinājuma pamatot, ka tie tiešām ir visi – 4 punkti.

**11.4.** Par mēģinājumiem, kas neved pie mērķa – līdz 2 punktiem.

Ja ir kaut tikai mēģināts lietot atbilstošo teorēmu – vismaz 3 punkti.

**11.5.** Ja pierādīta viena trijstūra eksistence – 5 punkti.

Par „šauriem speciālgadījumiem” – līdz 2 punktiem.

---

**12.1.** Par nestingro nevienādību – 4 punkti.

**12.2.** Par pareizu atbildi vien – 2 punkti.

**12.3.** Par pārveidojumiem, kas neved pie mērķa – līdz 2 punktiem.

**12.4.** Par mēģinājumiem, kas neved pie mērķa – līdz 2 punktiem.

Ja ir kaut tikai mēģināts lietot atbilstošo teorēmu – vismaz 3 punkti.

**12.5.** Par pareizu atbildi – 7 punkti arī tad, ja nav sakarīga pamatojuma, bet no darba redzams, ka atbilde iegūta, kaut ko domājot, nevis norakstot.

*Labu veiksmi Jums un Jūsu skolēniem!*

A.Liepas NMS